



**УСПЕХ
ВЫРАСТИМ
ВМЕСТЕ!**



**НОВИНКА
2025**

КЛОТИАМЕТ®

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПРЕПАРАТ ДЛЯ БОРЬБЫ
С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ
НА КАРТОФЕЛЕ**

**500 Г/КГ КЛОТИАНИДИНА
ВОДНО-ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ГРАНУЛЫ
ФАСОВКА: ПАКЕТ 1 Г**



**ИННОВАЦИОННАЯ
ФОРМУЛА**



**НОКДАУН-ЭФФЕКТ
ДЛЯ НАСЕКОМЫХ**



**БЫСТРОЕ
ДЕЙСТВИЕ**



**БЕЗОПАСНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ**



**ДЛЯ ОБРАБОТКИ
БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ**



+7 (495) 287 8536

117452, Россия, Москва,
Симферопольский бульвар, д. 29, к. 8

 agruskhim.ru
 info@s-ah.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✔ Уникальное действующее вещество препарата, имеет широкий спектр активности и вызывает нокдаун-эффект у насекомых — моментальный паралич и гибель через несколько часов после его применения.
- ✔ Клотиабет быстро перемещается по поверхности листа и проникает в ткани растения уничтожая вредителей не только при непосредственном контакте (локальное действие), но и скрытно живущих (системное действие).
- ✔ Мощная начальная активность препарата позволяет быстро справиться даже с большой численностью насекомых-вредителей за короткое время.
- ✔ Благодаря системному действию, гарантируется продолжительная защита от вредителей, в том числе и новообразованных частей растения, (проникает в растение через 2 часа и держится до 21 дня).
- ✔ Сохраняет активность при высоких температурах (+27 — +29 °C), низкой влажности, фотостабилен (устойчив к инсоляции), дождеустойчив.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

КУЛЬТУРА	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ	НОРМА РАСХОДА ПРЕПАРАТА	СПОСОБ, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	СРОК ОЖИДАНИЯ (КРАТНОСТЬ ОБРАБОТОК)
Картофель	Колорадский жук	0,2-0,25 г/100 м ² (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 5л/100м ²	5(1)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА



Налить
0,5 л воды



Добавить 0,2 г или
0,25 г препарата



Добавить до 5 л
воды, тщательно
перемешать



Опрыскивать
растения на
площади 100 м²